



DOSSIER CACIPLIQ20 SPRAY 7.5
UPOZORNĚNÍ / NÁVOD K POUŽITÍ

Verze: 01
Jazyk(v): CS
Datum: únor 2016
Strana 1 ze 2

Složení: Sterilní roztok CACIPLIQ20® (poly(karboxymethylglukosa-sulfát)).

Balení: Sprej obsahující 7,5 ml přípravku CACIPLIQ20®. Jeden střík vydá 0,14 ml roztoku.

Indikace: CACIPLIQ20® je látka ochraňující tkáňovou matrix ze skupiny RGTA® (ReGeneraTing Agents, regenerační látky), která podporuje přirozenou regeneraci kůže. Indikací k použití je hojení chronických kožních ran, včetně arteriálních vředů, ran a vředů na nohou u diabetiků, proleženin a venózních vředů; přípravek zmenšuje bolest, která je s nimi spojena.

Pokyny: Pečlivě připravte plochu rány tak, aby byla zbavena exudátu, fibrinových sraženin a nekrotické tkáně. Opláchněte ji fyziologickým roztokem. Před aplikací přípravku CACIPLIQ20® nepoužívejte jód, stříbro ani jiné polykationtové roztoky.

Držte nádobku přibližně ve vzdálenosti 5 cm od rány a postříkejte celý povrch rány včetně okrajů. Počkejte 5 minut a poté aplikujte na ránu obvyklé krytí, například krytí z parafinové gázy, a nepřilnavé sekundární krytí (nepoužívejte krycí materiály na bázi stříbra či jiných polykationtů).

Sprej obsahuje dostatek roztoku pro ošetření rány o ploše 7 až 9 cm² na jedno stlačení pumpičky.

Léčba: CACIPLIQ20® se aplikuje každé 3 nebo 4 dny (dvakrát týdně). Častější použití brání hojení.

Bezpečnostní opatření / kontraindikace: Před zahájením léčby přípravkem CACIPLIQ20® by měla být jakákoliv infekce pod kontrolou. Při systémové léčbě infekce (antibiotika, antimykotika atd.) lze přípravek CACIPLIQ20® použít. Nepoužívejte v kombinaci s lokálně aplikovanými aminoglykosidovými antibiotiky (gentamicin, neomycin atd.). Použití přípravku CACIPLIQ20® není indikováno u dětí do 18 let nebo těhotných či kojících žen. U jedinců citlivých na heparinoidy se může vyskytnout reakce lokální přecitlivělosti (zarudnutí, lokální otok, bolest, atd.). Pokud tyto příznaky přetrvávají, přerušete léčbu a poradte se se svým lékařem. Přípravek CACIPLIQ20® je určen k vícenásobnému použití. Pumpička je navržena tak, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci roztoku v nádobce, ke kontaminaci však může dojít při otevření pumpičky. Pokud se pumpička dotkne rány, je nutné ji před použitím dezinfikovat.

Uživatelé: CACIPLIQ20® je určen k aplikaci zdravotnickými pracovníky (zdravotní sestra, ošetřovatel, lékař) po důkladném vyčištění rány.

Výrobce: OTR3, 4 rue Française, 75001 Paris, Francie

Distributor: PentaGen s.r.o., Luční 239, 273 51 Horní Bezděkov, Česká republika, www.pentagen.cz










Další informace: Poznámky, komentáře a upozornění na nežádoucí reakce sdělte svému distributorovi nebo společnosti OTR3
contact@otr3.com; tel.: +33(0)1 83 64 23 00, fax: +33(0)9 55 72 44 53



DOSSIER CACIPLIQ20 SPRAY 7.5
UPOZORNĚNÍ / NÁVOD K POUŽITÍ

Verze: 01
Jazyk(v): CS
Datum: únor 2016
Strana 2 ze 2

Uchování: Uchovávejte nejvýše 30 dnů po otevření, na suchém místě, při teplotě od 2 do 25 °C. Krátkodobé a příležitostné vystavení vyšším teplotám (do 40 °C) nemá nepříznivý účinek na přípravek. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí data expirace uvedeného na obalu. Nepoužívejte, jestliže byla kterákoli komponenta soupravy poškozena a je nesterilní.

	Výrobce		Nepoužívejte, je-li balení poškozeno
	Kód šarže		Sterilizováno za použití aseptických metod zpracování (dvojitá filtrace)
	Datum expirace		Sterilní
	Doba použitelnosti po otevření		Teplotní omezení
	Upozornění, viz příložená dokumentace		